

Kleine chirurgische ingrepen

De volgende huidafwijkingen kunnen door middel van een kleine chirurgische ingreep worden verwijderd:

- Verheven moedervlekken
- (Ouderdoms)wratten
- Skin tags (huidflapjes of wild vlees)
- Ruby spots (rode vaatbultjes)
- Atheromen (talgklierzystes)
- Spider naevi (kleine spinvormige vaatjes)
- Kleine littekens

De ingreep

Afhankelijk van de ingreep duurt deze 10 tot 50 minuten. Nadat het te behandelen gebied is schoongemaakt en gedesinfecteerd, volgt er een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Dit voelt wat branderig aan. Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de arts bezig is. Het te behandelen gebied wordt afgedekt. Na de ingreep wordt deze bedekt met een pleister. De arts vertelt u wanneer de pleister verwijderd mag worden. Als u in het gezicht bent geopereerd worden de hechtingen meestal na een week verwijderd. Elders op het lichaam worden de hechtingen meestal na twee weken verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak bij Fraaii. Bij het gebruik van onderhuidse hechtingen of een hechtpleister hoeven de hechtingen niet meer verwijderd te worden.

Vormen van chirurgie

In de meeste gevallen zal een huidafwijking onder plaatselijke verdoving chirurgisch worden verwijderd middels een excisie (snee), waarbij rekening wordt gehouden met het beste cosmetische resultaat. Als het niet mogelijk is de wondranden direct te sluiten, wordt een 'plastic' toegepast. Dit is een techniek waarbij huid van elders wordt verschoven om de wond toch mooi te kunnen sluiten.

Ovaalvormige excisie

De huidafwijking wordt verwijderd onder plaatselijke verdoving. In een ovaalvorm worden altijd enkele millimeters extra verwijderd om er zeker van te zijn dat de huidafwijking helemaal verwijderd wordt. De randen van de wond worden vervolgens naar elkaar toe gebracht en gehecht.

Transposities

Wanneer een ovaalvormige excisie niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er te weinig 'ruimte' of 'rek' in de huid zit om de wondranden naar elkaar toe te brengen) kan een huidtranspositie worden toegepast. Hierbij wordt de wond gesloten met een stukje nabijgelegen huid.

Transplantaties

Bij grote huidafwijkingen of huidtumoren is soms een huidtransplantatie nodig om de wond te sluiten. Voor transplantaties in het gezicht wordt vaak de huid achter of voor het oor gebruikt als donorhuid, omdat deze qua structuur het meest op de gezichtshuid lijkt. Andere plekken die gebruikt kunnen worden als donorhuid zijn bijvoorbeeld de hals, de bovenarm of de lies.



Resultaat van de chirurgische ingreep

Vaak kan de huidafwijking met één behandeling worden verwijderd. Soms zijn meerdere behandelingen of sessies nodig. Door de behandeling ontstaat bijna altijd een litteken. Bij de ene persoon wordt het litteken mooier dan bij de andere. Dit heeft vooral te maken met uw huidtype. Littekens hebben soms de neiging breed en dik te worden (hypertroof litteken/keloïd). De plastisch chirurg streeft altijd naar het beste resultaat. Als u niet tevreden bent met het resultaat is het belangrijk om hierover contact op te nemen met de plastisch chirurg en te informeren naar eventuele aanvullende behandelingen (laser, littekenzalf, littekenpleisters).

Mogelijke complicaties

Bij eventuele napijn mag u een pijnstiller nemen (bij voorkeur Paracetamol, volgens de gebruiksaanwijzing), echter geen aspirine in verband met de kans op nabloedingen. Mogelijke complicaties zijn bloedingstoringen waarbij ook zwellingen op kunnen treden, of een infectie die zich uit door pijn, zwelling, roodheid en/of pus uit de wond.

Wanneer zich problemen voordoen of als er complicaties optreden, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Fraaii van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via 0543 544 545. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via 0900 500 9000. Uw huisarts of dienstdoende bepaalt of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Als er sprake is van een acute of levensbedreigende situatie, belt u direct 112. U wordt dan door een ambulance opgehaald en naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen?

Als u bloed verdunnende middelen gebruikt zoals acenocoumarol (sintrommitis), ascal, aspirine of carbasalaatcalcium moet u dit tijdens het eerste consult aan de arts melden. Sommige patiënten hebben bij operaties een antibioticum nodig in verband met een hartafwijking. Als u een hartafwijking hebt, meld dit dan bij uw arts voordat de afspraak voor behandeling is gemaakt. Ook wanneer u allergisch bent voor bepaalde stoffen zoals jodium of leukoplast, dient u dit vooraf te melden bij uw arts. Omdat u plaatselijk verdoofd wordt, hoeft u niet nuchter te zijn en mag u gewoon eten en drinken.

Contact

Indien u nog vragen hebt kunt u deze stellen aan de behandelaar of telefonisch via de secretaresse van Fraaii van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur via 0543 54 45 45 of info@fraaiicosmetiek.nl.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en informatie over geheimhouding, privacy, rechten en plichten kunt u lezen op onze website.

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts en kan op zichzelf nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. U kan aan het bovenstaande dan ook geen garantie omtrenten betreffende resultaten.