

Correctie van de bovenoogleden

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrekt dat deze over de ogen gaat hangen (dermatochalasie). Dit kan uw zicht belemmeren. Een vaak gehoorde klacht is dat cliënten vinden dat ze er zo moe of oud uitzien. Hangende bovenoogleden worden veroorzaakt door het slapper worden van de huid rondom het oog. Soms gaat dit samen met een ophoping van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd en gaat plooiën of er een bolling boven het oog ontstaat. De verslachte huid boven het ooglid kan gecorrigeerd worden door middel van plastische chirurgie.

Wanneer u (ook) last heeft van laaghangende wenkbrauwen, is een wenkbrauw- of voorhoofdslift de meest geschikte ingreep.

Vorbereiding

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat tijdens uw eerste consult aan uw arts melden. Bepaalde medicijnen, zoals aspirine en bloedverdunners mag u voor de operatie niet meer slikken of gebruiken. Dit gaat altijd in overleg met uw arts. Rookt u? Dan moet u hier vanaf zes weken vóór tot zes weken na de behandeling mee stoppen. Roken vernauwt namelijk de bloedvaten en veroorzaakt een slechtere doorbloeding. Hierdoor kunnen littekens niet goed genezen.

Behandeling

Correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke als algehele verdoving plaatsvinden. Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de poliklinische behandelkamer. U mag dan na een paar uur weer naar huis. Bij een algehele verdoving wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen. De anesthesist bespreekt dan met u hoe lang u van tevoren nuchter moet blijven.

Vlak voor de operatie markeert de arts het deel van de huid dat wordt verwijderd. Bij de operatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot, eventueel gecombineerd met overtollig vetweefsel, wordt vervolgens weggehaald. Het grootste deel van het litteken zit in de natuurlijke plooi van het bovenooglid waardoor het nauwelijks zichtbaar is.

Na een correctie van de bovenoogleden

Na een bovenooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, rood, blauw en gezwollen zijn. Ook kunnen er bloeduitstortingen ontstaan. Er wordt geen verband aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft. Het advies is om uw oogleden de eerste dagen te koelen met natte kompressen of een ijsbril, om pijn en zwelling tegen te gaan. U kunt hier ook diepvrieszakjes met doperwten voor gebruiken. Doe hier altijd een beschermlaag zoals bijvoorbeeld een washand omheen. Een pijnstillers is meestal niet nodig. Indien u toch pijnstillers wilt gebruiken adviseren wij u Paracetamol, volgens de gebruiksaanwijzing in de verpakking.

Uw plastisch chirurg vertelt wanneer u op controle komt om de hechtingen te laten verwijderen. De controle afspraak vindt plaats tussen de 7 – 10 dagen na de ingreep. Daarna kan het litteken eventueel met een zalf of crème ingesmeerd worden. Wij adviseren u om tot uw controle afspraak geen oogmake-up te gebruiken. In overleg met uw behandelaar kunt u na de controle, afhankelijk van uw situatie, weer oogmake-up gebruiken.

Adviezen

We geven u aan aantal adviezen voor na de behandeling:

- Til niet zwaar
- Draag de eerste week een zonnebril als u naar buiten gaat. Dit geeft rust aan uw ogen.
- Buk niet voorover
- Ga niet naar de sauna, zwemmen of in bad als de hechtingen er nog in zitten. U mag na 2 dagen weer douchen. Douche niet te lang en niet te heet.

Mogelijke risico's en complicaties

Soms ontstaat er een nabloeding. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden helemaal genezen. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden, een trekkend litteken of vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. Soms kunt u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet helemaal openen of sluiten. Om te voorkomen dat uw ogen uitdrogen kunt u via de arts oogdruppels of zelf verkrijgen. In zeldzame gevallen kan een holte met vocht (cyste) in het litteken ontstaan. Deze cyste wordt operatief verwijderd door de arts. Aan zwelling van de oogleden door vochtophoping kan weinig worden gedaan.

Bij een nabloeding van het vetweefsel kan een verhoogde druk in de oogkas ontstaan, waardoor de oogzenuw kan beschadigen. Dit gaat gepaard met pijn en een verminderd gezichtsvermogen. Deze verschijnselen zijn zeer zeldzaam, maar als u deze verschijnselen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw huisarts of met Fraaii.

Wanneer zich problemen voordoen of als er complicaties optreden, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Fraaii van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via 0543 544 545. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via 0900 500 9000. Uw huisarts of dienstdoende bepaalt of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Als er sprake is van een acute of levensbedreigende situatie, belt u direct 112. U wordt dan door een ambulance opgehaald en naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn.

Contact

Indien u nog vragen hebt kunt u deze stellen aan de behandelaar of telefonisch via de secretaresse van Fraaii van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur via 0543 54 45 45 of info@fraaiicosmetiek.nl.

Kosten

Indien gewenst kunt u een vrijblijvende offerte opvragen via 0543 54 45 45 of info@fraaiicosmetiek.nl.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en informatie over geheimhouding, privacy, rechten en plichten kunt u lezen op onze website.

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts en kan op zichzelf nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. U kan aan het bovenstaande dan ook geen garantie omtrenten betreffende resultaten.